



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ РЕАКЦИЯХ;



ПОДПИСАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ;



ОСМОТР И ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ВРАЧОМ (ИЗМЕРЕНИЕ САТУРАЦИИ, ЧСС, АД, АУСКУЛЬТАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

КОГДА?



**ДО ДОСТИЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА:
ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИЛИ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ**



**ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА:
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИЛИ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ**

**СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ, ИММУНИТЕТ,
ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НОВЫХ ШТАММОВ,
У ПЕРЕБОЛЕВШИХ СОХРАНЯЕТСЯ В СРЕДНЕМ 6 МЕСЯЦЕВ*

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ



1 - 2
СУТКИ

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ОЗНОБ,
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
ОБЩЕЕ НЕДОМОГАНИЕ,
БОЛЕЗНЕННОСТЬ В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ,
ОТЕЧНОСТЬ


РЕЖЕ

ТОШНОТА,
СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА,
ИНОГДА – УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕЛА ОТ 38 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНЯТЬ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ (ПАРАЦЕТАМОЛ И ИБУПРОФЕН). В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПОДОБНЫЕ РЕАКЦИИ ПРОХОДЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК.

**ВАКЦИНА НЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПЦР-ТЕСТА, ПОСКОЛЬКУ В НЕЙ НЕ СОДЕРЖИТСЯ ЖИВОЙ ВИРУС.*

АНТИТЕЛА



**ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО ПРОВОДИТЬ
ПРИ ЛЮБОМ УРОВНЕ АНТИТЕЛ!
ЗАМЕРЯТЬ ИХ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ НЕ НУЖНО.**

**У ИМЕЮЩИХСЯ СЕГОДНЯ ТЕСТ-СИСТЕМ ОТСУТСТВУЮТ
ДАННЫЕ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ,
ПРОТЕКТИВНОСТЬ, СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ К ОТВЕТУ НА МУТАЦИИ ВИРУСА). ПОЭТОМУ
ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ И КОЛИЧЕСТВА АНТИТЕЛ.*